

Impfstoffe gegen COVID-19 (SARS-CoV-2)

Hinweise zum Umgang und zur Qualittssicherung

Verfgbare Impfstoffe
 Stand 26.04.2021

| Impfstoff | Comirnaty® BioNTech/Pfizer | COVID-19 Vaccine Moderna | Vaxzevria® AstraZeneca | COVID-19 Vaccine Janssen® |
|--|--|--|---|---|
| Wirkprinzip | mRNA-Impfstoff | mRNA-Impfstoff | Vektorimpfstoff | Vektorimpfstoff |
| Zulassung ab – Lebensalter STIKO-Empfehlung | Ab 16 Jahre | Ab 18 Jahre | Ab 18 Jahre zugelassen ab 60 Jahre STIKO-Empfehlung | Ab 18 Jahre |
| Impfschema/Abstand | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Impfungen • Abstand 21 bis 42 Tage (3 bis 6 Wochen) | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Impfungen • Abstand 28 bis 42 Tage (4 bis 6 Wochen) | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Impfungen • Abstand 28 bis 84 Tage (4 bis 12 Wochen) • Nach STIKO- Empfehlung bis 12 Wochen | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Impfung |
| Lagerung bei Khlschranktemperatur, maximal | <ul style="list-style-type: none"> • 5 Tage | <ul style="list-style-type: none"> • 30 Tage | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Monate | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Monate |

| Impfstoff | Comirnaty® BioNTech/Pfizer | COVID-19 Vaccine Moderna | Vaxzevria® AstraZeneca | COVID-19 Vaccine Janssen® |
|--|---|---|---|---|
| Impfdosen je Ampulle | 6 Impfdosen | 10 Impfdosen | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Ampullengrößen! • 8 oder 10 Impfdosen | <ul style="list-style-type: none"> • 5 Impfdosen |
| Applikation | Immer intramuskulär | Immer intramuskulär | Immer intramuskulär | Immer intramuskulär |
| Vorbereitung und Aufziehen des Impfstoffes in der Spritze | NICHT SCHÜTTELN! Empfehlung: 2 Ampullen im Voraus aufziehen, | NICHT SCHÜTTELN! Immer nur 1 Impfdosis, welche sofort anzuwenden ist | NICHT SCHÜTTELN! Empfehlung: Nur 1 Impfdosis, welche sofort angewendet wird | NICHT SCHÜTTELN! Empfehlung: Nur 1 Impfdosis, welche sofort angewendet wird |
| Verwendungszeitraum vom Aufziehen bis zur Injektion | 6 Stunden bei Raumtemperatur | Immer sofort verimpfen! | Empfehlung: Immer sofort verimpfen | Empfehlung: Immer sofort verimpfen |
| Zeitraum von 1. Punktion bis zum Verbrauch der Ampulle | <ul style="list-style-type: none"> • Verdünnung notwendig! • 2 Stunden in der Ampulle bei Raumtemperatur • aufgezogene Impfdosen 6 Stunden bei Raumtemperatur • 6 Stunden in der Ampulle im Kühlschrank | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Stunden • Keine Verdünnung | <ul style="list-style-type: none"> • 48 Stunden, bei Kühlschranktemperatur • Keine Verdünnung | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Stunden bei Kühlschranktemperatur • 3 Stunden bei Raumtemperatur • Keine Verdünnung |